

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** GRUPO QUÍMICO: Benzoilurea.  
**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** Clase III (tres) IPCS/OMS, 2006. LIGERAMENTE PELIGROSO.

**PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS.** EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.** No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora, perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

**ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto.  
**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.**

**ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEJAS:** TOXICIDAD PARA AVES: Prácticamente no tóxico. TOXICIDAD PARA PECES: Levemente tóxico. TOXICIDAD PARA ABEJAS: Levemente tóxico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. PROHIBIDO EL USO DIFERENTE A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.



entre usted y sus cultivos

# ADVANCE 050 EC

## insecticida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	Porcentaje en peso (p/p)	Contenido en volumen
Lufenurón	5,10	50 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.  
 Registro N°: 3459.

FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

FABRICANTE: Agritec S.A.

ORIGEN: Uruguay

CONTENIDO NETO:

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A.

Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax: (598-2) 924 48 13\* MONTEVIDEO - URUGUAY.

www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

**GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:** ADVANCE 050 EC es un insecticida regulador del crecimiento que actúa por inhibición de la síntesis de quitina. Su modo de acción impide la muda de larvas en desarrollo lo que lo hace altamente específico para el control de lepidópteros y coleópteros no afectando enemigos naturales. ADVANCE 50 EC actúa fundamentalmente por ingestión presentando moderada acción de contacto. No es sistémico sin embargo presenta una importante acción residual. Por su modo de acción diferente es un insecticida apropiado para el control de insectos resistentes a insecticidas piretroides y organofosforados.

Cultivo	Plaga		Dosis(cm <sup>3</sup> /ha)
	Nombre común	Nombre científico	
Maíz	Lagarta Cogollera	Spodoptera frugiperda	300 cm <sup>3</sup> /ha
Soja	Lagarta de la soja y el mani	Anticarsia gemmatilis	150 cm <sup>3</sup> /ha
Trigo	Lagarta de los cereales	Pseudaletia adultera	100 cm <sup>3</sup> /ha
Cebada			

**MOMENTO DE APLICACIÓN:** Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de ADVANCE 050 EC una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico. Evitar aplicaciones con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y presencia de rocío sobre el follaje.

**MODO DE APLICACIÓN:** Agite bien el envase antes de usar. Llene el tanque de la máquina pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en funcionamiento agregar la dosis de ADVANCE 050 EC a utilizar. Luego completar con agua hasta lograr el volumen deseado. Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** ADVANCE 050 EC puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

**FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES:** Repetir las aplicaciones cuando se detecte reinicio de la infestación. TIEMPO DE ESPERA: Maíz: 30 días. Soja: 35 días. Trigo y Cebada: 28 días.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente.

**FITOTOXICIDAD:** ADVANCE 50 EC no ha presentado síntomas de fitotoxicidad siempre que sea aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

**COMPATIBILIDADES:** ADVANCE 50 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso corriente. Incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. En caso de dudas se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo.



CUIDADO

