CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase III (tres). IPCS/OMS,2006. LIGERAMENTE PELIGROSO.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón.Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la víctima del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Concurrir al médico llevando el envase o la etiqueta del producto.

ANTÍDOTOS: No tiene antídoto específico.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: TOXICIDAD PARA AVES: Prácticamente no tóxico. **TOXICIDAD PARA PECES:** Moderadamente tóxico. **TOXICIDAD PARA ABEJAS:** Virtualmente no tóxico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Si el tipo de envase es una bolsa una vez que la misma esté vacía perfórela para evitar su reutilización como tal.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

agritec

entre usted y sus cultivos

AGRIPROXYFEN

insecticida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
Pyriproxyfen	10,8	100 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Registro N°: 2969. **LOTE:**

FABRICACIÓN: **VENCIMIENTO:**

FABRICANTE: Jiangsu Kuaida Agrochemical Co. Ltd. **ORIGEN:** China

CONTENIDO NETO: **USO AGRÍCOLA**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Importa, formula y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

INSTRUCCIONES DE USO: AGRIPROXYFEN es un insecticida regulador del crecimiento que actúa mediante la supresión de la embriogénesis, inhibición de la metamorfosis y de la reproducción. Actúa por contacto y posee una fuerte actividad translaminar. No tiene control directo sobre el adulto, pero reduce significativamente la producción de huevos viables. Posee poder ovicida e inhibe la transformación de ninfas, larvas y pupas al estadio adulto.

Cultivo	Plaga		Dosis PC (cm^3/100 L)
	Nombre común	Nombre científico	
Manzana Pera	Piojo de San José	Quadraspidiotus perniciosus	60
Citrus	Mosca blanca	Aleurothrixus floccosus	70

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Debido a que **AGRIPROXYFEN** es un regulador del crecimiento y su acción insecticida depende del estado de desarrollo de los insectos, los tratamientos deben iniciarse al comienzo de la oviposición o al momento de la eclosión de las larvas. Para el control de Carpocapsa aplicar antes de la eclosión de los huevos.

NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: Realizar una sola aplicación por estación.

COMPATIBILIDAD Y FOTOTOXICIDAD: No compatible con los productos de reacción alcalina. En caso de dudas se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo.

TIEMPO DE ESPERA: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 45 días en manzana y pera y 1 día en citrus.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: MODO DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de **AGRIPROXYFEN** y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.

TÉCNICA DE APLICACIÓN: AGRIPROXYFEN puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

CUIDADO

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE x3

USO EXCLUSIVO PARA FINES COMERCIAL
NO APTO PARA USO DOMESTICO