PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Bencimidazol. **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL (IPCS/OMS 2009).
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **ANTÍDOTOS:** No tiene.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Producto muy tóxico para peces, poco tóxico para aves y ligeramente tóxico para abejas. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno ZB".

agritec

entre usted y sus cultivos

AGRIZIM 500 SC

fungicida

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Ingrediente Activo	Carbendazim
Porcentaje en peso (p/p)	43,1 %
Contenido en Volumen	500 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Registro Nº: 3242 **LOTE:**

FABRICACIÓN: **VENCIMIENTO:**

FABRICANTE: Jiangsu Lanfeng Biochemical Co., Ltd. **ORIGEN:** China.
CONTENIDO NETO: **USO AGRÍCOLA**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.
Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363.
Telefax: (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: INSTRUCCIONES DE USO: AGRIZIM 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido principalmente por hojas, aunque también puede ser absorbido por raíces. El uso repetido y/o continuado de **AGRIZIM 500 SC** puede generar resistencia, por esta razón se sugiere su utilización con fungicidas de modo de acción diferente.

Cultivo	Enfermedad Nombre común	Enfermedad Nombre científico	Dosis	Momento
Manzano Peral	Sarna	Venturia inaequalis Venturia pyrina	30-50 cc/100 lt	De pimpollo rosado a caída de pétalos, cada 7 días. Luego cada 10 a 14 días.
Manzano	Oídio	Podosphaera leucotricha	30-50 cc/100 lt	Desde caída de pétalos cada 10 días, mientras duren las condiciones favorables.
Durazneros Nectarinos Damascos	Podredumbre morena	Monilia fructicola	30-60 cc/100 lt	Desde yema hinchada a completa caída de pétalos.
Citrus	Sarna	Sphaceloma fauwcetti	50-60 cc/100 lt	Botón floral, caída de pétalos y 20 días después.
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinérea	50-70 cc/100 lt	Fin de floración a cuajado, antes del cierre del racimo, al comienzo del envero y 4 semanas antes de cosecha.
Frutilla	Moho gris			De comienzo a fin de floración, especialmente con tiempo húmedo.
Acelga Remolacha	Viruela	Cercospora beticola	200-250 cc/ha	Sintomático cada 7 a 10 días.
Arroz	Brusone	Piricularia oryzae	500-1000 cc/ha	Al hinchado de la espiga y a la emergencia de la panoja. En caso de ataque muy severo aplicarlo en mezcla con otro fungicida de modo de acción diferente.
	Podredumbre del tallo	Sclerotium oryzae		
	Cercosporiosis	Cercospora oryzae		
Trigo Cebada	Golpe blanco	Fusarium graminearum	500 cc/ha	Desde el comienzo de la espigazón y principalmente en floración.

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Aplicar siguiendo las recomendaciones establecidas en el cuadro de Dosis. En caso de pronósticos de lluvia, evitar la aplicación de **AGRIZIM 500 SC** ya que el mismo puede ser lavado por precipitaciones que ocurran dentro de las 2-3 horas posteriores a la aplicación, afectando la efectividad del fungicida. Evitar también la aplicación sobre cultivos en condiciones de estrés: sequías, bajas temperaturas, etc. **NÚMERO, FRECUENCIA, O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES:** Normalmente una sola aplicación es suficiente para realizar un buen control.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: No mezclar con preparados alcalinos. Si la compatibilidad es desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para fito-compatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante, si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. No es fitotóxico para los cultivos recomendados siempre que se aplique siguiendo las instrucciones establecidas en esta etiqueta.
TIEMPO DE ESPERA: Entre la aplicación y la cosecha debe mediar el siguiente tiempo de espera: manzano, peral, durazneros, nectarinos, damascos, citrus, vid y frutilla: 15 días; remolacha y acelga: 21 días; arroz y trigo: 35 días, cebada: 56 días. **TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado. **OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO:** Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia. Limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Agite bien el envase antes de usar. Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de **AGRIZIM 500 SC** y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. El producto puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres buscando siempre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

COPIA PARA PROMOCIONAL
NO VENTA
VENTA USO OFICIAL