

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Triazol.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase III Ligeramente peligroso (IPCS/OMS 2006).

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión no inducir el vómito. Contacto con los ojos: Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: Lavado de las partes afectadas con abundante agua ó agua y jabón y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL C.I.F.A.T. (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7° PISO) TELÉFONO 1722. EN TODOS LOS CASOS, CONSULTAR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO Y/O EL ENVASE.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Producto ligeramente tóxico para aves; poco tóxico para abejas; altamente tóxico para peces. No aplicar en forma terrestre a menos de 10 metros de distancia de lagunas, ríos, represas u otras fuentes de agua. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosas para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfóre el envase para evitar su reutilización.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. No trasvasar a otros envases. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar alejado de recintos utilizados como vivienda y estar señalizado con cartel de advertencia.



entre usted y sus cultivos

CIERTO 250 EC

fungicida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo Propiconazole

Porcentaje en Peso (p/p) 25,0 %

Contenido en Volumen 250 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
Registro N°: 3545

FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

FABRICANTE: Agritec S.A.

ORIGEN: Uruguay.

CONTENIDO NETO:

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A.

Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.

www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: CIERTO 250 EC es un fungicida del grupo de los triazoles que actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. CIERTO 250 EC es un producto de acción sistémica con translocación acropétala a través del xilema que actúa en forma preventiva, protegiendo al cultivo contra la enfermedad, y curativa evitando el desarrollo de la enfermedad aún cuando se observen los primeros síntomas de desarrollo de la misma.

Cultivo	Enfermedad		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
Arroz	Necrosis de la Vaina	Rhizoctonia oryzae	
	Aplicar desde embuche cuando se registren los primeros síntomas.		
	Septoriosis	Septoria tritici	
Trigo	Roya Anaranjada	Puccinia recóndita	0,5 lt/Ha
	Mancha Amarilla	Drechslera tritici	
	Aplicar a partir de la observación de los primeros síntomas, en especial durante el periodo que va desde el embuche hasta la espigazón para proteger la hoja bandera.		
	Mancha en Red	Helminthosporium teres	
Cebada	Escaldadura	Rhynchosporium secalis	0,150 cc/Ha + 0,150 cc de CONNECT 250 EC
	Aplicar en forma preventiva cuando se registren las condiciones ambientales que predispongan al desarrollo de la enfermedad o cuando se detecten los primeros síntomas de la misma en especial durante el periodo que va de fin de macollaje a comienzo de encañazón.		
	Mancha Púrpura	Cercospora kikuchi	
	Mancha Parda	Septoria glieche	
Soja	Tizón del Tallo	Phomopsis sojae	0,150 cc/Ha + 0,150 cc de CONNECT 250 EC
	Mancha Ojo de Rana	Cercospora sojae	
	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o preventivamente al inicio de formación de vainas (R3 R4).		

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. No obstante, en caso de compatibilidad desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala para observar compatibilidad física y reacciones sobre los vegetales objeto de la aplicación. Considerar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta no es esperable la aparición de problemas de fitotoxicidad. TIEMPO DE ESPERA: Arroz, Trigo, Cebada 30 días, Soja 21 días.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Llenar con agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la máquina pulverizadora. Con el agitador o retorno en funcionamiento agregar CIERTO 250 EC de acuerdo a la dosis a utilizar y luego completar el llenado de la máquina con la cantidad de agua necesaria. Realizar la aplicación siempre con el agitador en funcionamiento. CIERTO 250 EC puede ser aplicado en forma aérea y/o terrestre buscando siempre lograr una cobertura total y uniforme del cultivo. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o sub-urbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o sub-urbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado. OTRA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO AL USO: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia. Limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.



CUIDADO



x3