PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Ciclohexanodiona.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase III (tres). LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009.**PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. **TOXICIDAD PARA AVES:** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **TOXICIDAD PARA PECES:** LIGERAMENTE TÓXICO. **TOXICIDAD PARA ABEJAS:** VIRTUALMENTE TÓXICO.
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno ZB".

agritec

entre usted y sus cultivos

CORSARIO
herbicida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	CLETHODIM
Porcentaje en Peso	24,8 %
Contenido en Volumen	240 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
REGISTRO N°: 3092 **LOTE N°:**

FABRICACIÓN: **VENCIMIENTO:**

FABRICANTE: SHANDONG CYNDA CHEMICAL CO. LTD. **ORIGEN:** China.
CONTENIDO NETO: **USO AGRÍCOLA**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax: 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: INSTRUCCIONES DE USO: CORSARIO es un herbicida sistémico, selectivo, efectivo contra una amplia variedad de gramíneas anuales y perennes, para su utilización en aplicaciones post-emergentes sobre cultivos de soja, girasol, alfalfa, lotus, trébol blanco, trébol rojo, colza, porotos y papa. Luego de realizada la aplicación, es rápidamente absorbido y fácilmente translocado hacia el sistema radicular y puntos de crecimiento de las malezas, deteniendo su crecimiento. **CORSARIO** actúa distorsionando la síntesis de lípidos mediante la inhibición de la enzima carboxilasa de la Acetil Coenzima A.

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis L/ha.	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
Alfalfa Colza	Gramilla	Cynodon dactylon	0,55-0,70	Aplicar sobre la maleza en activo crecimiento, con estolones de hasta 15 cm. de largo y 10 cm. de desarrollo foliar.
Girasol Lotus	Sorgo de Alepo de rizoma	Sorghum halepense	0,40-0,50	Aplicar sobre la maleza en activo crecimiento y con 30 cm. de altura.
Papa Poroto Soja Trébol blanco Trébol rojo	Sorgo de Alepo de semilla Capin Pasto blanco Eleusine Raigras Trigo guacho	Sorghum halepense Echinochloa crusgalli Echinochloa colona Digitaria Sanguinalis Eleusine indica Lolium multiflorum Triticum aestivum	0,35-045	Aplicar sobre malezas en activo crecimiento. Desde 3 hojas verdaderas hasta el macollaje.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimínela para evitar que se propague.
MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Aplicar con malezas en activo crecimiento y durante sus primeros estadios de desarrollo. Evitar aplicaciones en condiciones de stress hídrico y altas temperaturas.
Número, frecuencia ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Normalmente una sola aplicación efectuada correctamente es suficiente para lograr un buen control.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es compatible con prácticamente la totalidad de los agroquímicos de uso común. No combinar con productos fuertemente alcalinos. En caso de duda realice una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de utilizar el producto sobre el cultivo. **CORSARIO** no es fitotóxico siempre que sea utilizado a las dosis recomendadas y siguiendo las instrucciones establecidas en la etiqueta.
TIEMPO DE ESPERA: Entre la última aplicación y la cosecha deben dejarse transcurrir 60 días para la totalidad de los cultivos. No pastorear áreas tratadas hasta luego de transcurridas 8 semanas desde la aplicación. **TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado dejando transcurrir 24 horas como mínimo.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: MODO DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de **CORSARIO** y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento. Utilice siempre Aceite Agrícola. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
TÉCNICA DE APLICACIÓN: El producto puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres buscando siembre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. Para lograr los objetivos mencionados calibre el equipo adecuadamente y use boquillas de abanico plano. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

CUIDADO

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE x3

ETIQUETA PARA PROMOCIONAL
NO VENDIBLE
PARA USO COMERCIAL