

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: ÁCIDO FENOXICARBOXILICO.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO
 IPCS/OMS,2006.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS, E INSTRUCCIONES DE MANEJO DE ENVASES: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de la aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.** No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Luego de vaciar el contenido del envase, hacer el Triple Lavado, vertiendo el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión provocar NO el vómito. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua. Quitar la ropa contaminada con el producto y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la víctima del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEJAS: Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TÓXICO. Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro, bajo llave. El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno k".



entre usted y sus cultivos

FLUID AMINA NF

herbicida

CONCENTRADO SOLUBLE

| Ingrediente Activo | Porcentaje en peso (p/p) | Contenido en volumen |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2,4 D; Sal Dimetilamina | 42,0 % | 480 g/L |
| 2,4-D Ácido | 34,6 % | 400 g/L |

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
 Registro N°: 2512

FABRICACIÓN: VENCIMIENTO:

FABRICANTE: AGRITEC S.A. **ORIGEN:** Uruguay.
CONTENIDO NETO: USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A.
 Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363
 Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: FLUID AMINA NF es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal recomendado para el control en post-emergencia de malezas de hoja ancha. Una vez aplicado el producto, el mismo es absorbido a través de las hojas, translocándose por xilema y floema (apósimplástico), produciendo enrollamiento de las hojas apicales y clorosis generalizada de la planta, con su posterior muerte. FLUID AMINA NF actúa por disrupción del crecimiento celular.

| Cultivo | Malezas | | Dosis L/ha | Observaciones |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------|--|
| | Nombre común | Nombre científico | | |
| Trigo | | | | |
| Cebada | Abrojo | Xanthium cavanillesii | 1,0 - 1,2 | Desde pleno macollaje hasta primer nudo visible. |
| Centeno | Capiquí | Stellaria media | | |
| Avena | Cardo Negro | Cirsium vulgare | | |
| Alpiste | Cepa caballo | Xanthium spinosum | | |
| | Cerraja | Sonchus oleraceus | 0,75 | Plantas de 10-15 cm de altura. Aplicación en cobertura total. |
| | Corrigüela | Convolvulus arvensis | | |
| Maíz | Chamico | Datura ferox | hasta 1,0 | Plantas de 15-20 cm de altura. Aplicación en cobertura total. |
| Sorgo | Diente de León | Taraxacum officinale | hasta 2,0 | Con más de 6 hojas. Aplicación dirigida sin mojar el follaje. |
| | Mostacilla | Rapistrum spp. | | |
| | Lengua de Vaca | Rumex crispus | | |
| Arroz | Llantén | Plantago lanceolata | 1,0 - 1,5 | Desde pleno macollaje hasta detección del primer nudo de encañado. |
| | Quinoa | Chenopodium album | | |
| | Sanguinaria | Polygonum sp. | 2,0 - 2,5 | Pre-emergencia, con caña planta o soca. |
| Caña de Azúcar | Verdolaga | Portulaca oleracea | 2,0 - 3,0 | Post-emergencia, con plantas de más de 20 cm de altura. |
| Tratamientos en Pre-Cosecha | Yuyo colorado | Amaranthus quitensis | 1,5 - 2,0 | Aplicar en grano pastoso para facilitar cosecha. |

MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar de acuerdo a los momentos establecidos en el cuadro de dosis y respetar los estados fenológicos indicados. FLUID AMINA NF puede ser fitotóxico si se aplica fuera de los momentos recomendados. Para lograr los mejores resultados se recomienda aplicar con buena humedad en el suelo, radiación solar adecuada y temperaturas superiores a 15° C de forma de asegurar un activo crecimiento de la maleza. En situaciones de sequía la efectividad del herbicida puede verse afectada por menor translocación. Con malezas pequeñas utilizar las dosis menores en tanto que con malezas de mayor desarrollo utilizar dosis mayores.

TIEMPO DE ESPERA: No pastorear áreas tratadas, hasta transcurridos 21 días después de la aplicación. En caso de aplicaciones en pre-cosecha respetar un periodo de 21 días entre aplicación cosecha.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Normalmente una sola aplicación por cultivo realizada correctamente es suficiente. **COMPATIBILIDADES:** Compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas y fertilizantes foliares comúnmente utilizados. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la máquina pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador en funcionamiento, agregar la cantidad indicada de producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado. El producto debe ser aplicado con equipos terrestres y/o aéreos buscando lograr una cobertura total y uniforme del área a tratar fijando objetivos de 30 - 40 impactos/cm². No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros e cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.



NOCIVO



x3