PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Triazol.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: PRODUCTO POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL. IPCS/OMS, 2006.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua o agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la victima del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.
CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Producto poco tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces y moderadamente tóxico para abejas. Tomar la precaución de no aplicar directamente sobre las abejas o colmenas.
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su re-utilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.

agritec

entre usted y sus cultivos

FLUTEC 125 SC

fungicida

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Ingrediente Activo	Flutriafol
Porcentaje en Peso	12,0 %
Contenido en Volumen	125 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
Registro Nº: 3011 **LOTE:**

FABRICACIÓN: **VENCIMIENTO:**

FABRICANTE: JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO., LTD. **ORIGEN:** China.
CONTENIDO NETO: **USO AGRÍCOLA**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín. Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax: 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: INSTRUCCIONES DE USO: FLUTEC 125 SC es un fungicida sistémico, de amplio espectro, que penetra y distribuye rápidamente en los tejidos vegetales, desarrollando propiedades protectoras y erradicantes. **FLUTEC 125 SC** es un fungicida del grupo de los triazoles que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol.

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga (1) Nombre Común	Nombre Científico	DOSIS PC (L/HA)
Trigo	Septoriosis	Septoria tritici	1,0
	Roya estriada	Puccina striiformis	
	Roya de la hoja	Puccinia recóndita	
	Fusariosis	Fusarium graminearum	
Soja	Roya de la soja	Phakopsora pachyrhizi	0,4-0,5
Cebada	Oídio	Erysiphe graminis	1,0

(1) Si el producto no tiene acción biocida (insecticida, herbicida, etc.), indicar el efecto Ej.: Regulación de maduración.
OBSERVACIONES: Para cada uso o sitio de aplicación especificar seguidamente:

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben ser efectuadas a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En trigo aplicar antes de que la enfermedad alcance 1% del área foliar. Para Fusarium aplicar al comienzo de floración. Para roya de la soja se puede aplicar en forma preventiva desde los estadios R 3 a R 4 o en forma curativa con la aparición de los primeros síntomas. Realizar evaluaciones periódicas del cultivo para detectar la aparición de la enfermedad y aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas. Se sugiere consultar el Programa Nacional de Vigilancia para obtener información complementaria a nivel zonal.
NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: En cultivos con alto potencial de rendimiento y cuando las condiciones ambientales son favorables para ataques severos, repetir el tratamiento a las 3 a 4 semanas.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: FLUTEC 125 SC es compatible con la mayoría de los productos de uso común. En caso de dudas se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta no efectuar la mezcla.
TIEMPO DE ESPERA: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 21 días. **TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Agitar bien el envase antes de abrirlo. Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de **FLUTEC 125 SC** y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. **FLUTEC 125 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre o aéreo. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (rios, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

ETIQUETA PARA COMERCIALIZACIÓN
NO VALIDA PARA USO COMERCIAL