

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: ARILOXIFENOXIPRODIONATO. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (dos) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2004.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL C.I.A.T. TELÉFONO 1722 (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7° PISO). CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para peces: MUY TÓXICO. Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalado con cartel de advertencia.



entre usted y sus cultivos

# FOKO 240 EC

## herbicida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	Porcentaje en peso (p/p)	Contenido en volumen
Clodinafop-propargyl	24,48 %	240 g/L
Cloquintocet-mexyl	6,1 %	60 g/L

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. Registro N°: 3224 NÚMERO DE LOTE:

FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

FABRICANTE: Agritec S.A.  
CONTENIDO NETO:

ORIGEN: Uruguay.  
USO AGRÍCOLA

PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA ETIQUETA.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A. Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  
Telefax: (598-2) 924 48 13\* MONTEVIDEO - URUGUAY.  
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

RECOMENDACIONES DE USO: GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: FOKO 240 EC es un herbicida de acción sistémica selectivo para el cultivo de Trigo, efectivo para el control de Avena spp. y Lolium spp. Se aplica en post-emergencia de las malezas y del cultivo. FOKO 240 EC es absorbido a través de hojas y partes verdes para trasladarse rápidamente a los puntos de crecimiento de la maleza.

Maleza	Nombre científico	Dosis	Momento de Aplicación	
Balango	Avena spp	125 cc/há	2 a 4 hojas	
		150 cc/há	macollaje-encañado	
		200 cc/há	encañado-embuchado	
Ryegrass	Lolium spp	200 cc/há	2 a 4 hojas	
		Setaria spp		macollaje
		Alpistillo		
Capin	Echinochloa spp			

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se sugiere su aplicación al estado de tres hojas del cultivo, con malezas emergidas, y antes de la diferenciación de la espiga del trigo. FOKO 240 EC no tiene residualidad por lo que es recomendable esperar la emergencia de la mayor cantidad de malezas antes de realizar la aplicación. En caso de pronóstico de lluvias aplicar hasta dos horas antes de que se registren precipitaciones. No aplicar herbicidas para control de malezas de hoja ancha hasta pasados siete días desde el tratamiento con FOKO 240 EC. Condiciones de stress al momento de la aplicación reduce la efectividad, evitar las aplicaciones con temperaturas muy bajas.

MODO DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear FOKO 240 EC y luego adicionar adherente. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.

MÉTODO DE APLICACIÓN: El producto puede ser aplicado con equipos terrestres y/o aéreos. Para aplicaciones terrestres usar boquillas de abanico plano. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. COMPATIBILIDADES: No es recomendable las mezclas con herbicidas de hoja ancha por problemas de antagonismo de diferente magnitud según las condiciones y dosis utilizadas. En caso de que FOKO 240 EC se aplique primero espere como mínimo siete días antes de aplicar herbicidas hormonales. En caso de que se realice la aplicación de MCPA ó 2,4 D previo a la aplicación de FOKO 240 EC se sugiere dejar transcurrir 21 días antes de la aplicación de FOKO 240 EC.

CONTRAINDICACIONES: FOKO 240 EC no se puede aplicar sobre cultivos de avena y/o cebada. TIEMPO DE ESPERA: En caso de ser utilizado en trigos de pastoreo, se sugiere dejar transcurrir 45 días entre aplicación y la entrada del ganado.



NOCIVO

