Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Neonicotinoide
Número de Registro: 5458
Nombre del fabricante o formulador: Raúl Oscar Aguerre e hijos S.A.
País de origen: ARGENTINA
Nombre y dirección de la firma registrante: AGRITEC S.A.
Avda. Gral. Rondeau 2363, Montevideo, URUGUAY
Teléfonos: 2924-4813

Cuidado-Veneno

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:
AGRIMEX-I es un cebo hormiguicida, listo para usar, formulado especialmente para controlar hormigas cortadoras. Su atractivo hace que las hormigas dejen su carga y recojan el cebo, para llevarlo al hormiguero. Una vez ahí AGRIMEX-I actúa y elimina el hormiguero. Actúa sobre las hormigas por contacto e ingestión.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS PC
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	
CULTIVOS AGRICOLAS	Hormiga cortadora común Hormigas	Acromymex lundi Acromymex spp.	25 g/hormiguero

Momento(s) de aplicación: para cada combinación: puede aplicarse en cualquier momento del año, durante periodos de actividad de las hormigas.
Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Normalmente, una sola aplicación es suficiente para lograr un buen control. Si fuera necesario un repaso dejar transcurrir 60 a 90 días desde la primera aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Por tratarse de un cebo granulado AGRIMEX-I se aplica en forma individual.
TIEMPO DE ESPERA: Debido al uso como hormiguicida, no corresponde.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No corresponde.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Aplicar el producto directamente de la bolsa, sin contacto manual, a lo largo de las sendas y/o caminos, próximo a las bocas activas del hormiguero. No colocar el producto dentro de las bocas, ya que puede ser devuelto por las hormigas. No manipular directamente con las manos. Mantener el envase bien cerrado evitando el contacto con productos que pudieran determinar la pérdida del poder atrayente del cebo.
MODO DE APLICACIÓN: Localizar la boca del hormiguero y aplicar, el contenido del envase, en montículos y a los lados del camino. Siempre a una distancia de 50 cm a 1 metro de la boca del mismo. Si las hormigas han consumido todo el producto realizar otra aplicación hasta que cese su actividad, ya que la cantidad consumida depende del tamaño del hormiguero. No aplicar sobre o dentro de las bocas del hormiguero.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en días con posibilidad de lluvias.

Por Resolución MGAP de fecha 14 de mayo de 2004 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, sub urbana y centro poblado. También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (Cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana, sub urbana y centro poblado.
Por Resolución MGAP N° 129 de fecha 27 de febrero de 2008 están prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Se prohibe el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde las corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
Por Resolución MGAP N° 188/011 de 25 de marzo de 2011 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas y terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivos a menos de 500 metros y 300 metros respectivamente, del límite del predio de los centros educativos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE U – IPCS/OMS 2019
POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:
• En caso de ingestión, **provocar** el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
• Contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante, durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
• Contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
• En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al **CIAT, teléfono (02)1722** y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:
A) MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma.
• No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua, o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
• En caso de derrame durante la aplicación contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
• La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas.
B) PELIGROSIDAD
TOXICIDAD PARA PECES/ORGANISMOS ACUÁTICOS: LIGERAMENTE TOXICO
TOXICIDAD PARA AVES: MUY TOXICO
TOXICIDAD PARA ABEJAS: ALTAMENTE TOXICO Debido a la modalidad de uso autorizada no representa riesgos para las abejas.
El producto al ingresar al hormiguero se deposita en la honguera, de forma tal que ni aves ni abejas pueden tener acceso a él.
TOXICIDAD ORGANISMOS DE SUELO (LOMBRICES): MODERADAMENTE TOXICO
Realizado el Análisis de Riesgo para estos organismos, el mismo señala que los riesgos se consideran aceptables.

"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES:
Una vez vaciado el contenido del envase no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. Trasladar los envases con triple lavado al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELÉFONO: (2) 1722.
CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTA.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
USO AGRICOLA.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESPECIFICADO EN LA ETIQUETA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

ATENCIÓN - CUIDADO

VENENO

Cont. Neto
500g

Zipper Pouch, envase más práctico y hermético.

Corte por aquí

Hormiguicida

agritec

AGRIMEX-I

Cebo Granulado

NO MANIPULAR DIRECTAMENTE CON LAS MANOS

NOMBRE DEL INGREDIENTE ACTIVO:	PORCENTAJE EN PESO:
IMIDACLOPRID	0,05%

MATERIAL DE PROMOCIÓN